
EXTRA
FORCE
СЛОЖНИ ТЕЧНИ
БИОСТИМУЛАТОРИ

„ПЕСТИЦИД“ ЕООД

е една от първите компании в България, която е създадена за комплексно обслужване и задоволяване потребностите на земеделските производители

“Пестицид” ЕООД разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на растителната защита, селекцията и семепроизводството и научно-развойната и внедрителска дейност

“Пестицид” ЕООД предлага собствена селекция висококачествени и високодобивни сортове пшеница, търсени не само в България, но и в съседни страни

Освен собствени семена фирма „Пестицид“ еоод е спечелила доверието на най-реномираните компании в бранша, за чиито сортове и хибриди произвежда и заготвя семена



Регионалните агрономи на „Пестицид“ ЕООД, покриващи територията на цялата страна, предлагат оптимална комбинация от продукти персонализирани за всеки производител в зависимост от възможностите на стопанството и целите на производството му

“Пестицид” ЕООД извършва широкомащабна семепроизводна дейност в собствена и доказано една от най-високотехнологичните и модерно оборудвани бази за почистване и заготовка на семена в България



Всеки един продукт за растителна защита, сорт, хибрид, тор и др., преди да стигне до клиентите, се изпитва предварително на експерименталните полета на фирмата



34 ГОДИНИ

01 високо квалифицирани специалисти

02 собствена селекция високодобивни сортове пшеница

03 препарати за растителна защита

04 качествени и ефективни семена

05 торове

Базирана на иновативна технология, „Пестицид“ ЕООД успешно развои производството на патентовани и одобрени по Екосхема 3 торове “Extra Force”



Модерна високотехно-логична производствена линия, която сама по себе си е естествен тунел за проникване на всички необходими хранителни вещества в растенията, без които човечеството не може да съществува









ЗЕМЕДЕЛИЕТО

... Е ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРИТЕ И ПЕРСПЕКТИВНИ ОТРАСЛИ. ЧРЕЗ НЕГО СЕ ОСИГУРЯВА ИЗХРАНВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЕ ОСИГУРЯВАТ СУРОВИНИ ЗА РЕДИЦА ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА.

КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА ЗАВИСИ ОТ:

- СВОЙСТВАТА И ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА
- КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
- ОПАЗВАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ
- ТОРЕНЕТО

Всяка година се появяват нови сортове и хибриди с още по-висок потенциал за добив. Те са по-взискателни към условията на отглеждане и са силно зависими към оптималното предоставяне на макро и микроелементи. Околната среда пък става все по-негостоприемна – големи температурни амплитуди, късни пролетни замръзи, студени дъждовни периоди последвани от рязко засушаване и много високи температури. Всички тези фактори на околната среда влияят крайно негативно върху правилното развитие на растенията. Ние не можем да въздействаме на атмосферните условия, но можем да влияем пряко на растежа и развитието на отглежданите от нас култури и по този начин да се справяме с негативните фактори на околната среда.

СРЕДСТВАТА С КОИТО СИ СЛУЖИМ СА БИОСТИМУЛАТОРИТЕ

ТОРЕНЕТО ОСТАВА ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

- ИНОВАТИВНИ
- С УНИКАЛНИ КАЧЕСТВА
- **”ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ”** ОТ ОРГАНОГЕННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, ХУМИНОВИ И ФУЛВИНОВИ КИСЕЛИНИ



ТРЕТИРАНЕ НА **СЕМЕНА**



ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ



ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ



НОВ НОВ НОВ



НОВ

ОРГАНОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, ОТ КОЙТО РАСТЕНИЯТА ИЗГРАЖДАТ СВОЯ ОРГАНИЗЪМ

- C – ВЪГЛЕРОД
- N – АЗОТ
- O – КИСЛОРОД
- P – ФОСФОР
- H – ВОДОРОД
- Mg – МАГНЕЗИЙ
- S – СЯРА

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ГЛАВНО ЗА НОРМАЛНИЯ ОБМЕН НА ВЕЩЕСТВАТА В РАСТИТЕЛНИЯ ОРГАНИЗЪМ

- Ca – КАЛЦИЙ
- Fe – ЖЕЛЯЗО
- Cu – МЕД
- Mn – МАНГАН
- Mo – МОЛИБДЕН
- Zn – ЦИНК
- B – БОР
- K – КАЛИЙ

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

ХУМИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ СА ТЪМНИ МАКРО-МОЛЕКУЛИ, КОИТО СИЛНО ПОДОБРЯВАТ СВОЙСТВАТА НА ПОЧВАТА. ТЕ ОСИГУРЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРА МОБИЛНОСТ НА НАЛИЧНИТЕ В ПОЧВЕНИЯ СУБСТРАТ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСИЛВАТ ЗАДЪРЖАНЕТО НА ВОДА ОКОЛО КОРЕНА НА РАСТЕНИЕТО. ХУМИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ ПРИТЕЖАВАТ ХЕЛАТИРАЩО ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАТ СЕ С МИКРО-ЕЛЕМЕНТИТЕ И СЪЗДАВАТ ВРЪЗКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЯТО СЕ АБСОРБИРАТ ПО-ДОБРЕ ОТ РАСТЕНИЯТА.

ДОПРИНАСЯТ ЗА МНОГО ПО-ЕФЕКТИВНОТО ПОГЛЪЩАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ТЕ СЪЩО ТАКА СИЛНО СТИМУЛИРАТ РАЗВИТИЕТО НА КОРЕНА

ФУЛВИНОВИ КИСЕЛИНИ

ФУЛВИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ СА МОЛЕКУЛИ С МНОГО ПО-НИСКО МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО. ХАРАКТЕРИЗИРАТ СЕ С БЪРЗО И ЛЕСНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КЛЕТЪЧНИТЕ МЕМБРАНИ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНИ СА ПРИ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПОРАДИ БЪРЗАТА АБСОРБЦИЯ. ВЪЗДЕЙСТВАТ СИЛНО СТИМУЛИРАЩО НА ПРОЦЕСА ФОТОСИНТЕЗА.

ИНДЕТИФИКАЦИЯ ЗА ДЕФИЦИТ

АЗОТ



Азотът пряко участва в процесите на растеж и размножаване на живите организми, влизайки в състава на белтъците. Недостигът на азот предизвиква сериозни смущения в растителния организъм. Като например – потиска се синтеза на хлорофил в листата и те стават жълто-зелени. Пожълтяването започва най-напред от старите листа, които по-късно опадват, растежа на растението се забавя и вегетацията завършва преждевременно. Това води до ниски и разочароващи добиви.

ФОСФОР



Фосфорът участва в редица процеси – дишане, фотосинтеза, делене на клетките. Той участва както в синтеза, така и в транспорта на въглехидратите в растенията. Оказва влияние върху количеството и качеството на получената продукция. При недостиг на фосфор растенията придобиват синьо-зелен цвят с виолетов оттенък. Листата са дребни, матови, периферията им се завива и се образуват широки виолетови петна и тъканите в засегнатото място засъхват и умират.

КАЛИЙ



Калият има изключително важно значение за водния режим на растението. Добре осигурените с калий растения преодоляват по-добре периодите на засушаване. Калият повишава устойчивостта на растения към студ и болести. При недостиг на калий листата загубват блясък, между жилките се образуват хлоротични петна. На по-късен етап по периферията на листата се появяват кафяви петна и преждевременно окапват.

КАЛЦИЙ



Калцият е изключително важен и необходим още в периода на покълването на семената. Влияе пряко върху зоната на нарастване и има голямо значение за нормалния растеж на кореновата система. Необходим е и за развитието на надземните органи. При недостигът му корените стават къси и удебелени с малък брой власинки. Задържа се растежът на младите листа, по тях се появяват светложълти петна и по-късно окапват. Старите листа остават нормални, но растежа е преустановен.

МАГНЕЗИЙ



Магнезият влиза в състава на молекулата на хлорофила и пряко участва във фотосинтезата. При недостиг на магнезий хлорофила в зелените части на растението намалява. Листата стават петнисти и избледняват между нерватурата. На по-късен етап изцяло пожълтяват и окапват.

СЯРА



Сярата е изключително важен елемент защото влиза в състава на белтъчините и витамините. При недостиг на сяра листната площ намалява и растежът на растенията намалява. Младите листа стават светлозелени, хлоротични и почти бели, а старите запазват естествения си цвят. При продължително гладуване се появява антоцианово оцветяване.

МАНГАН

Манганът е свързан с обмяната на вещества в растителния организъм. Той повишава качеството на продукцията. Недостигът на манган води до образуване на петниста хлороза – по листата между жилките се появяват светло-жълти точковидни петна. На по-късен етап петната се сливат по дължина на листата в дълги непрекъснати ивици, които постепенно засъхват, покафеняват и се появяват участъци с мъртва тъкан.

МЕД

Медта засилва образуването на хлорофил и намалява разрушаването му в листата. Повишава устойчивостта на растенията към високи и ниски температури. Недостигът на мед се характеризира с побелявяне и бързо изсъхване на върхните листа. Житните растения не изкласяват или образуват бели класове без зърна.

ЦИНК

Цинкът участва в редица важни ензими. Необходим е в точките на растежа на младите листа, генеративните органи и зародишите на семената. При недостиг на цинк спира нарастването на междувъзлията. По листата се появяват светло-зелени тънки ивици между нерватурата, която остава зелена. Появява се пурпурен оттенък.

МОЛИБДЕН

Молибденът участва в синтеза на белтъци и ензими. Изключително важен, той има голямо значение за кръговрата на азота и усвояването му от растенията. При недостиг на молибден се появява между-жилкова хлороза, листата пожълтяват и се завиват нагоре. По краищата на листата се образуват некротични петна.

ЖЕЛЯЗО

Желязото влиза в състава на ензими, които участват в редица важни физиологични процеси – дишане, фотосинтеза, синтез на хлорофил. При недостиг на желязо се наблюдава промяна в пигментацията на листата. Между жилките придобиват бледозелен а по-късно светложълт цвят. Жилките остават зелени с червеникав оттенък. По краищата на листата се появяват некротични петна, след което некротират и загиват.

БОР

Борът регулира дейността на много от жизненоважните ензими в растителния организъм. Увеличава броя на цветовете и завръзите. Необходим е през цялата вегетация. При силен недостиг се наблюдава отмиране на конуса на нарастване на растенията. Листата пожълтяват, по-късно потъмняват и некротират. При някои растения се наблюдава усукване или разцепване на стъблото.



УНИКАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ

- ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
- ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ
- ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

УНИКАЛНОСТТА НА НАШИТЕ БИОСТИМУЛАТОРИ СЕ ПРОЯВЯВА ЧРЕЗ РЕДИЦА ПРЕИМУЩЕСТВА СПРЯМО ДРУГИ КОНКУРЕНТНИ ПРОДУКТИ

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА



ТРЕТИРАНЕТО С ПРОДУКТИТЕ EXTRA FORCE ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШАВА КЪЛНЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ НА СЕМЕНАТА, ТАКА ТЕ ПОКЪЛВАТ И ИЗНИКВАТ ДРУЖНО. МЛАДИТЕ РАСТЕНИЯ СЕ ВКОРЕНЯТ МНОГО ЗДРАВО, ДОБРЕ ГАРНИРАНИ.

НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ПРОДУКТИ:



ДОЗА 150-200МЛ/ 100КГ СЕМЕНА

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИЯТ МЕТОД ЗА СНАБДЯВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА С ЖИЗНЕНО ВАЖНИ МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ. БИОСТИМУЛАТОРИТЕ EXTRA FORCE ВЛИЯЯТ ПРЯКО ВЪРХУ РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРИТЕ КАТО ПОДОБРЯВАТ ФОТОСИНТЕЗАТА, УВЕЛИЧАВАТ ЛИСТНАТА И ОБЩАТА БИОМАСА, СТИМУЛИРАТ ЦЪФТЕЖА И МЕТАБОЛИЗМА, ИЗВЕЖДАТ РАСТЕНИЯТА ОТ СЪСТОЯНИЕ НА СИЛЕН СТРЕС ПОРОДЕН ОТ АНОМАЛИИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИЛИ ФИТОТОКСИЧНОСТ ОТ ХЕРБИЦИДИ. А ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ВИСОКИ И КАЧЕСТВЕНИ ДОБИВИ.



ДОЗА 150-200МЛ/ДКА

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗПОЛЗВА СЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ДОЗИ ОТ 1-3Л/ДКА ПРИЛОЖЕНИ ЗАЕДНО С ПОЛИВКИТЕ. МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ СИЛНО СТИМУЛИРАТ ПОЧВЕНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ И КОРЕНИТЕ И КОРЕНОВИТЕ ВЛАСИНКИ СЕ УДЪЛЖАВАТ И РАЗКЛОНЯВАТ СИЛНО.

НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ПРОДУКТИ:



ДОЗА 1,5Л/ДКА

ДОЗА 2Л/ДКА



СИГУРЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН EXTRA ДОБИВ С ГАМАТА EXTRA FORCE

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛНА **КОНСУЛТАЦИЯ И ГАРАНТИРАНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ ВИ**

15%

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ с продуктите **EXTRA FORCE.** Доказали се не само на Българския пазар, но и в чужбина. Свържете се с наш представител още днес – 74-75стр.

TIHON +P +Mg +Zn

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

„TIHON +P +Mg + Zn" е универсален течен неорганичен тор богат на фосфор, магнезий и цинк. Фосфорът участва в състава на редица растителни органични вещества, които изпълняват важни жизнени функции в растителният организъм. Магнезият спомага натрупването на захари, а с това и студоустойчивостта на културите и тяхното качество. Цинкът оказва влияние върху важни процеси като фотосинтезата, дишането, образуването и действието на растителните хормони. Този продукт спомага за формирането на здрава коренова система, скъсява периода на узряването, удължава срока на съхранение на продукцията и увеличава добива в зависимост от схемата на торене, състоянието на почвата и растенията. Прилага се при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на семена, разсад, ливади и пасища.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате „TIHON +P +Mg + Zn". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество „TIHON +P +Mg + Zn".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	39,7 %
P_2O_5	6 %
K_2O	1,517 %
MgO	1,22 %
S	2,74 %
Zn	2,44 %
pH	< 4

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират
*Стойностите са от анализите за регистрация на продукта.

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

TIHON VitalMax

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

„TIHON Vital Max" е универсален тор с растителни хормони, богат на фосфор, калий, цинк, магнезий и сяра. Фосфорът и цинка участва в редица важни жизнени процеси в растителният организъм като дишане и фотосинтеза. Магнезият спомага натрупването на захари, а с това и студоустойчивостта на културите и тяхното качество . Спомага за формирането на здрава коренова система. Скъсява периода на узряването. Растителните хормони и аминокиселини контролират всички аспекти на растеж и развитие на растенията,защита срещу патогени,търпимост към стрес. Удължава срока на съхранение на продукцията. Увеличава добива в зависимост от схемата на торене, състоянието на почвата и растенията. Прилага се при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на семена, разсад, ливади и пасища.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате „TIHON Vital Max". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество „TIHON Vital Max".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	36,5 %
P_2O_5	5,41 %
K_2O	2,196 %
MgO	1,63 %
S	3,301 %
Zn	3,07 %
pH	< 4
Общ Органичен Въглерод	0,0012 %

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират
*Стойностите са от анализите за регистрация на продукта.

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

MALACHI SUPER

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален течен органичен тор богат на макро и микроелементи. С високо съдържание на органичен въглерод. Въздейства стимулиращо както на растенията, така на микроорганизмите в почвата. Високото съдържание на органичен въглерод стимулира силно почвените микроорганизми, които предоставят допълнителни количества азот и фосфор за растенията. “MALACHI Super” предоставя всички необходими елементи за правилното развитие на растенията предоставяйки ги в лесно усвоима форма без разход на енергия от страна на растенията.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате „MALACHI Super”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество „MALACHI Super”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	71,9 %
Органичен въглерод*	38,1%
N*	1,501 %
P_2O_5	0,093 %
K_2O	0,409%
MgO	839 mg/l
CaO	10680 mg/l
S	704 mg/l
Zn	135,13 mg/l
Cu	45,1 mg/l
Mo	506 mg/l
B	2893 mg/l
Fe	246 mg/l
Mn	152,4 mg/l
pH	7,35

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
	Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

TITUS+

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Органо минерален биостимулатор, съдържащ всички необходими органогенни и функционални елементи. Обогатен е с растителни хормони и амини, които въздействат активно при стресови ситуации. “TITUS +” повишава устойчивостта на растенията и действа като растежен стимулатор.Спомага за формирането на мощна коренова система.Подпомага цъфтежа и задържането на завръзите. Скъсява периода на узряване.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате „TITUS +”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество „TITUS +”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	6,3 %
Органичен въглерод*	9,56 %
N*	0,78 %
P_2O_5	1,302 %
K_2O	2,1%
MgO	28 mg/l
CaO	95 mg/l
S	58 mg/l
Zn	2,52 mg/l
Cu	0,2 mg/l
Mo	1,02 mg/l
B	90 mg/l
Fe	0,9 mg/l
Mn	0,2 mg/l
pH	10,51

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
	Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

URIEL

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Невероятен коктейл от макро и микроелементи, фитохормони с изключително високо съдържание на азот - 44,77 % и високо съдържание на органичен въглерод. Наличието на двата най-важни органогенни елементи във висока концентрация и в течна форма прави Uriel подходящ за основно и коригиращо подхранване. Елементът азот е в две форми – амониева и нитратна за по-бързо усвояване и по-стабилно задържане в почвения субстрат. Съдържа също и високи дози от елементите магнезий, калий, калций, фосфор, фитохормони и аминокиселини.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате „URIEL". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество „URIEL".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	32,50 %
Органичен въглерод*	19,95%
N*	44,77 %
P_2O_5	0,029 %
K_2O	0,185%
MgO	776 mg/l
CaO	194 mg/l
$N\text{-}NO_3$	704 mg/l
$N\text{-}NH_4$	135,13 mg/l
pH	6,74

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

URIEL

micro — max

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален, течен, органо-минерален тор съдържащ всички необходими макро и микро-елементи, но с високо съдържание на азот - 33,8 % и органичен въглерод. Двата най-важни органогенни елементи във високи дози и течна форма правят продукта “Uriel micro-max” подходящ за основно и коригиращо подхранване. Освен високите стойности на азот и органичен въглерод, “Uriel micro-max” е обогатен и с висока доза бор. Изключително подходящ за култури чувствителни към липса на бор – рапица, слънчоглед и др.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “Uriel micro-max”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “Uriel micro-max”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	35,6 %
Органичен въглерод*	9,56 %
N*	16,45 %
P_2O_5	1,91 %
K_2O	1,74%
MgO	259 mg/l
CaO	49 mg/l
S	683 mg/l
Zn	3,64 mg/l
Cu	0,61 mg/l
Mo	377 mg/l
B	9335 mg/l
Fe	0,64 mg/l
Mn	0,35 mg/l
$N\text{-}NO_3$	7,99
$N\text{-}NH_4$	0,35 mg/l
pH	7,99

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

URIEL +S +Mg

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Подобрява развитието на растенията и повишава добивите. Обогатен с растителен хормон, растителна аминокиселина, магнезий и сяра. Магнезият спомага натрупването на захари, а с това и студоустойчивостта на културите и тяхното качество. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената. Растителния хормон подобрява устойчивостта на растенията към бактериологични и вирусни заболявания и адаптацията им към стресови условия. Спомага за формирането на здрава коренова система. Скъсява периода на узряването. Удължава срока на съхранение на продукцията. Увеличава добива в зависимост от схемата на торене, състоянието на почвата и растенията. Прилага се при всички култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на семена, разсад, ливади и пасища.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "Uriel +S +Mg". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "Uriel +S +Mg".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	37,3 %
MgO	22400 mg/L
pH	7,12
Общ Азот	31,83 %
Mg	24083 mg/L
S	32318 mg/L
Разтворими форми на нитратен азот**	16,2 mg/L
Разтворими форми на амониев азот**	167,1mg/L

*На база сухо вещество
**Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират
**Стойностите са от анализите за регистрация на продукта.

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

URIEL

+NO_3 +Mg

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален, органо минерален тор, обагатен с магнезий и растителни хормони. Високото съдържание на азот и магнезий прави този тор особено ефективен при всички видове култури. Магнезият спомага натрупването на захари, а с това и студоустойчивостта на културите. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената. Действието на растителния хормон и растителната аминокиселина подобрява устойчивостта на растенията към бактериологични и вирусни заболявания и адаптацията им към стресови условия. Спомага за формирането на здрава коренова система. Скъсява периода на узряването. Удължава срока на съхранение на продукцията. Увеличава добива в зависимост от схемата на торене. Прилага се при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в културационни съоръжения чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на семена, разсад, ливади и пасища.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “Uriel +S +Mg”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “Uriel +S +Mg”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	38,8 %
MgO	22400 mg/L
pH	7,29
Общ Азот	35,98 %
Разтворими форми на нитратен азот*	23,9 mg/L
Разтворими форми на амониев азот*	175,2 mg/L

*На база сухо вещество

**Поради естествения и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

**Стойностите са от анализите за регистрация на продукта.

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

MATEY

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален, органичен тор – естествен биорегулатор на растенията, оптимизиран коктейл от активни хумусни компоненти, растежни регулатори и хранителни елементи, които активизират процеса на обмяната на веществата в стресови за растенията ситуации. Това осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в резултат на действието на неблагоприятните климатични условия – рязко застудяване, излизане от презимуване, засушаване, градушка и др.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "MATEY". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "MATEY".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	9-11 %
Органичен въглерод*	6,21 %
N*	0,34 %
P_2O_5	0,125 %
K_2O	4,5%
MgO	741 mg/l
CaO	1021 mg/l
S	1120 mg/l
Zn	1,34 mg/l
Cu	2,3 mg/l
Mo	3,4 mg/l
B	9,12 mg/l
Fe	10,52mg/l
Mn	2,56 mg/l
pH	10,5-12

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

AMINO GOLD

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Сложен течен биостимулатор съдържащ аминокиселини от растителен произход, високо съдържание на органичен въглерод, хуминови и фулвинови киселини и всички органогенни и функционални елементи. “AMINO GOLD” е с повишено съдържание на фосфор, който благоприятства развитието на корените и по-доброто вкореняване на растенията. Високото съдържание на сяра и калий подсилват действието на аминокиселините при обмяната на вещества в растенията.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “AMINO GOLD”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “AMINO GOLD”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органично вещество от растителен произход (съдържа всички незаменими аминокиселини):

- Азот(N)* общ 16,5%;
- Въглерод (C)* органичен 13%;
- Фосфор (P2O5) общ 0,02%;
- Калий (K2O) общ 0,2%;
- pH 8 - 9

*на база сухо вещество

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

AMINO GURII

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Сложен течен биостимулатор представляващ коктейл от аминокиселини, макро и микро-елементи, органичен въглерод, хуминови и фулвинови киселини, растежни регулатори и други хранителни елементи. Високото съдържание на аминокиселини стимулира силно обмяната на вещества и предоставя хранителни вещества без разход на енергия от страна на растението. С високото съдържание на фосфор, калий, азот, сяра, молибден и бор.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "AMINO GURII". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "AMINO GURII".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органичен въглерод*	2,807 +/– 0,014 %
N*	7,17 +/– 0,04 %
P_2O_5	0,2497 +/– 0,011%
K_2O	5,718 +/–0,032 %
MgO	414 +/– 10 mg/l
CaO	192 +/– 2 mg/l
S	4724 +/– 34 mg/l
Zn	21,36 +/– 0,4 mg/l
Cu	31,6 +/– 0,3 mg/l
Mo	386,9 +/– 1,2 mg/l
B	2122 +/– 27 mg/l
Fe	52,4 +/– 0,3 mg/l
Mn	44,4 +/– 0,2 mg/l
pH	7 – 8

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

AMINO MAX

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален органичен тор, представляващ разтвор на аминокиселини, органичен въглерод, макро и микроелементи. По-високото съдържание на аминокиселини активира процеса на обмяната на вещества в стресови за растенията ситуации. Високо съдържание на сяра и калий, които допълнително засилват движението и натрупването за захари в растенията. Изключително подходящ при стресирани растения.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "AMINO MAX". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "AMINO MAX".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органично вещество от растителен произход (съдържа всички незаменими аминокиселини):

- Азот(N)* общ 16%;
- Въглерод (C)* органичен 12%;
- Фосфор (P2O5) общ 0,002%;
- Калий (K2O) общ 0,2%;
- pH 8 - 9

*на база сухо вещество

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

AMINO TRIPLE

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Сложен течен биостимулатор с органичен произход. Оптимизиран коктейл от хранителни елементи, аминокиселини от растителен естествен произход, активни хумусни, компоненти и растежни регулатори. По-високото съдържание на основните органогенни елементи активизира процеса на обмяна на вещества в стресови за растенията ситуации. Повишено съдържание на азот, фосфор и калий.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "AMINO TRIPLE". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "AMINO TRIPLE".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органичен въглерод*	1,910 +/– 0,023%
N*	7,54 +/– 0,04 %
P_2O_5	1,810 +/– 0,018 %
K_2O	4,18 +/– 0,25 %
MgO	495/20 mg/l
CaO	219,1 +/– 18,2mg/l
S	6703 +/– 111mg/l
Zn	115,1 +/– 1,0mg/l
Cu	36 +/– 1 mg/l
Mo	388+/– 6 mg/l
B	2507+/– 8 mg/l
Fe	63,5 +/–1,2 mg/l
Mn	205,7 +/– 1,3 mg/l
pH	6-7

*На база сухо вещество
Произведен от СЖП материал Категория 2

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

sila.

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Течен, органичен биостимулатор от ново поколение. Изцяло от растителен произход, стимулира растежа и развитието на растенията благодарение на своя уникален състав. Съдържа всички необходими органогенни и функционални елементи и е с завишено съдържание на органичен въглерод в лесно усвоима форма.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “SILA”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “SILA”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Органично вещество от растителен произход:

- Азот(N)* общ 0,89%;
- Въглерод (C)* органичен 12,86%;
- Фосфор (P2O5) общ 1,292%;
- Калий (K2O) общ 2,02%;
- pH 10 – 11

*на база сухо вещество

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

sila. B+Mo

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Сложен органо-минерален биостимулатор, който съдържа всички необходими макро и микроелементи, с повишено съдържание на елементите бор и молибден, което го прави изключително подходящ и задължителен за употреба при култури като слънчоглед, рапица, овощни култури и зеленчуци. Борът спомага на културата да преодолява стресови ситуации като засушаване. Доза – 200 мл/дка по време на вегетацията и преди цъфтеж.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “SILA B+Mo”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “SILA B+Mo”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органично вещество от растителен произход:

- Азот(N)* общ 1,078%;
- Въглерод (C)* органичен 11,078%;
- Фосфор (P2O5) общ 1,333%;
- Калий (K2O) общ 2,21%;
- Молибден(Mo) 21 г/л ;
- Бор(B) 50 г/л pH 10-11

*на база сухо вещество

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
	Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

sila. Zn + Mo

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Биостимулатор с високо съдържание на органичен въглерод, цинк и молибден, подкрепени от всички останали елементи. Изключително подходящ при царевица, пшеница, ечемик, ръж, тритикале. Силно стимулира растежа и регулира правилното развитие на растения като ги предпазва от физиологични смущения причинени от неблагоприятни условия на околната среда. Приложим по всяко време на вегетацията на растенията.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “SILA Zn+Mo”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “SILA Zn+Mo”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Органично вещество от растителен произход:
- Азот(N)* общ 1,088%;
- Въглерод (C)* органичен 12,8%;
- Фосфор (P2O5) общ 1,294%;
- Калий (K2O) общ 2,85%;
- Цинк (Zn) 3г/л
- Молибден (Mo) 2 г/л
- pH 10 – 11

*на база сухо вещество

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

sila. MAX

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Универсален органо-минерален тор от естествен произход. Естествен биорегулатор на растенията с високо съдържание на органичен въглерод, макро и микроелементи. Осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в резултат от въздействието на неблагоприятните климатични условия (рязко застудяване, излизане от презимуване, засушаване, градушки и др.). Прилага се при всички култури.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “SILA MAX. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “SILA MAX”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органичен въглерод*	13,06 %
N*	1,042 %
P_2O_5	1,342%
K_2O	2,03 %
MgO	6,9 mg/l
CaO	304 mg/l
S	187 mg/l
Zn	39 mg/l
Cu	50 mg/l
Mo	150 mg/l
B	300 mg/l
Fe	4,6 mg/l
Mn	2,2 mg/l
pH	10 – 11

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

EXTRA FORCE

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Изцяло с органичен произход EXTRA FORCE снабдява растенията с всички необходими елементи и може да се прилага по всяко време на вегетацията. Приложен през есента, заедно с инсектицид (ако се налага борба с житните мухи или други неприятели), той ще спомогне и за изграждането на траен имунитет и по-доброто презимуване на зърнено-житните култури. Приложен напролет, доставя по най-бързия и лесен начин азот, фосфор и всички останали необходими елементи, за да може растението бързо и здраво да влезе във вегетация.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “EXTRA FORCE”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “EXTRA FORCE”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Органичен въглерод*	15 – 30 %
N*	1,0 – 2,0 %
P_2O_5	0,05 – 0,45 %
K_2O	1,3 – 2,0 %
MgO	0,02 – 0,06 %
CaO	0,1 – 0,3 %
Сухо вещество	5,5 - 7,0 %
Zn	5 - 15 mg/l
Cu	2 - 10 mg/l
Mo	2 - 8 mg/l
B	1,0 – 10 mg/l
Fe	100 – 500 mg/l
Mn	10 – 30 mg/l
pH	10 – 13

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ERMEI

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Биостимулаторът с най-високо съдържание на калций. Приложим е във всички култури, но е безотказен при зеленчукови, както и при всички останали след неблагоприятни атмосферни условия (градушки, много силни бури и ветрова ерозия). Благодарение на високото си съдържание на калций (елемент, който е необходим още от самото покълване на растението), ERMEI спомага за изграждане на здрав кълн и бързо поникване. След тежки градушки и ветрова ерозия препоръчваме употребата на този продукт в дозата от 200мл на декар, за да може растението да излезе от ситуация на стрес и да започне отново едно добро развитие и нарастване.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "ERMEI". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "ERMEI".



ДОБИВ ОТ ДКА	ПШЕНИЦА	ЦАРЕВИЦА
БЕЗ ТРЕТИРАНЕ	643	912
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE	662 (РАЗЛИКА 101КГ)	945 (РАЗЛИКА 50,5КГ)
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE + ДВУКРАТНО ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ С ERMEI (2021Г.)	744	962,5

РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 12,0 %
Органичен въглерод*	2,0 – 6,0 %
N*	0,12 – 0,5 %
P_2O_5	0,015 – 0,06 %
K_2O	2,0 – 6,0 %
MgO	200 – 1000 mg/l
CaO	200 – 1500 mg/l
S	800 – 3000 mg/l
Zn	0,5 - 500 mg/l
Cu	1 - 100 mg/l
Mo	1 - 50 mg/l
B	5 – 500 mg/l
Fe	5 – 1000 mg/l
Mn	1 – 250 mg/l
pH	9 – 14

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ERMEI +B

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

„ERMEI +B" е универсален органичен тор богат на бор и е ефективен при всички култури. Борът оказва положително влияние върху нарастването на кореновата система, като допринася за удължаването на клетките. Този микроелемент играе важна роля за преминаването на хранителните елементи през клетъчните мембрани, върху интензивността на фотосинтезата, образуването на аскорбинова киселина и на важни растежни вещества. Недостигът на бор намалява поглъщането на калция от растенията и потиска нормалното развитие на културите. Внасянето на бор повишава хлорофилното съдържание и намалява пероксидазната активност, което обяснява положителното му влияние за преодоляване на вредното действие на високи дневни температури, на почвено и атмосферно засушаване. Прилага се при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения чрез листно пръскане, капково напояване, третиране на семена, разсад, ливади и пасища.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "ERMEI +B". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "ERMEI +B".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	37,8 %
B	49489 mg/L
S	4543 mg/L
pH	8,73
Общ Азот*	6,41 %
Общ органичен въглерод	10,9 %

*На база сухо вещество
**Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират
**Стойностите са от анализите за регистрация на продукта.

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
	Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ZINOVII GRAND

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Използваме есенно време, за да снабдим растението с основните макро- и микроелементи. Както и за третиране на семена преди сеитбата за бързо покълване и изникване и гарантирано получаваме добре гарниран и равномерен посев. След трети лист на културите, главно при пшеница, използваме отново “ZINOVII GRAND”, благодарение на високото съдържание на мед, калий и други важни елементи в него той помага да се изгради добър имунитет на растението и то презимува по-надеждно. Използваме го и по-късно през вегетацията за третиране преди изкласяване, за да дадем допълнителен стимул на растенията, да ги снабдим с микроелементи.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “ZINOVII GRAND”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “ZINOVII GRAND”.



ДОБИВ ОТ ДКА	ПШЕНИЦА	ЦАРЕВИЦА	СЛЪНЧОГЛЕД
БЕЗ ТРЕТИРАНЕ	643	912	362
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE	662 РАЗЛИКА 63КГ	945 РАЗЛИКА 108КГ	400 РАЗЛИКА 25КГ
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE + ДВУКРАТНО ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ С ZINOVII GRAND (2021Г.)	706	1020	450

РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3,0 – 8,0 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 6000 mg/l
Zn	10 - 5000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	100 - 1000 mg/l
B	200 – 1000 mg/l
Fe	5 – 3000 mg/l
Mn	10 – 5000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ZINOVII CORN + Zn

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Продукт, който предимно използваме при отглеждане на царевица поради високото му съдържание на елемента цинк. Цинкът е изключително важен елемент още от самото покълване на семето. Той влиза в състава на всички ензими в растителния организъм и е необходим за по-нататъшното развитие на културата, особено ако тази култура е царевица. Приложен във фази трети-осми лист по време на вегетацията в доза 200мл на декар "ZINOVII CORN" снабдява растението напълно с така необходимия за тази култура елемент цинк, освен това снабдява растението с всички останали макро- и микроелементи.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "ZINOVII CORN". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "ZINOVII CORN".



ДОБИВ ОТ ДКА	ПШЕНИЦА	ЦАРЕВИЦА	СЛЪНЧОГЛЕД
БЕЗ ТРЕТИРАНЕ	643	912	362
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE	662	945	400
РАЗЛИКА	44КГ	125КГ	56,25КГ
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE + ДВУКРАТНО ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ С ZINOVII CORN (2021Г.)	687	1037	450

РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3 – 8 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 12000 mg/l
Zn	10 - 6000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	100 - 1000 mg/l
B	200 – 1000 mg/l
Fe	5 – 3000 mg/l
Mn	10 – 5000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ZINOVII OIL + B

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Продуктът, който създадохме специално за етерично-маслените култури. В него съдържанието на бор е най-високо, а борът влиза в процесите дишане, изграждане на генеративните органи и спомага за по-доброто опрашване. Желателно да бъде внесен на два или три етапа като при рапица първото третиране е през есента, когато имаме добре развита растителна маса след поне трета двойка същински листа, а при слънчогледа може да внесем продукта в начало на бутонизация, за да добавим така необходимия бор и растението да влезе здраво във фаза цъфтеж. Освен бор, "ZINOVII OIL" предоставя всички останали макро- и микроелементи, необходими за развитието на тези култури.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "ZINOVII OIL". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "ZINOVII OIL".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3 – 8 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 6000 mg/l
Zn	10 - 5000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	100 - 1000 mg/l
B	3000 – 7500 mg/l
Fe	5 – 3000 mg/l
Mn	10 – 5000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	**СЕМЕНА**	**100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА**

ZINOVII DOUBLE + Mo

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Течен биостимулатор, който е с най-високо съдържание на молибден. Препоръчителен при бобовите култури, които имат изразена нужда от молибден. Често се наблюдава липса на молибден и при слънчоглед – най-вече след трета същинска двойка листа и малко преди Бутонизация. Точно в тези критични фази можем да внесем продукта "ZINOVII DOUBLE" в дозата от 200мл на дка, за да задоволим нуждите на растението и то да влезе здраво във фаза Цъфтеж. При зеленчуковите култури можем да го прилагаме по всяко време, понеже те изпитват още по-голяма нужда от молибден като елемент.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "ZINOVII DOUBLE". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "ZINOVII DOUBLE".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3 – 8 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 6000 mg/l
Zn	10 - 5000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	1000 - 7500 mg/l
B	200 – 1000 mg/l
Fe	5 – 3000 mg/l
Mn	10 – 5000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ZINOVII GREEN + Mn

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Всяка култура по време на своята вегетация изпитва нужда от определени макро- и микроелементи. “ZINOVII GREEN” е с най-високо съдържание на манган, а манганът е основният елемент, който влиза в обмяната на вещества и е изключително важен за растенията. След дългото и продължително преовлажняване и изстудяване на почвата, последвано от рязко засушаване и покачване на температурите, пшеницата и ечемика дадоха симптоми на остра нужда от манган. Приложихме продукта в дозата от 200 мл на декар, като след това отчетохме повишаване на добивите до 140кг/дка спрямо нетретираните контролни полета.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “ZINOVII GREEN”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “ZINOVII GREEN”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3 – 8 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 12000 mg/l
Zn	10 - 5000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	100 - 7500 mg/l
B	200 – 1000 mg/l
Fe	5 – 3000 mg/l
Mn	10 – 6000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
	Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ZINOVII

TRIPLE + N P K

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Идеален за третиране на семена преди сеитба, като ги снабдява с важни елементи за тяхното развитие. “ZINOVII TRIPLE” прилагаме и веднага след встъпване на растенията във вегетация през пролетта, понеже съдържанието на азот в него е по-високо в сравнение с останалите течни биостимулатори. При пшеница го внасяме при първо влизане на полето заедно с фунгицида и хербицида, за да дадем по най-бързия начин така необходимия азот, без да изчерпваме енергия от растението, защото то е достатъчно изтощено от неблагоприятните зимни условия.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “ZINOVII TRIPLE”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “ZINOVII TRIPLE”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

+ ХУМИНОВИ КСЕЛИНИ

Сухо вещество	8,0 – 20,0 %
Органичен въглерод*	1,0 – 5,0 %
N*	2,0 – 6,0 %
P_2O_5	3,0 – 8,0 %
K_2O	2,0 – 6,0 %
MgO	2000 – 5000 mg/l
CaO	20 – 200 mg/l
S	1000 – 8000 mg/l
Zn	100 - 2500 mg/l
Cu	10 - 500 mg/l
Mo	5 - 150 mg/l
B	200 – 800 mg/l
Fe	50 – 3000 mg/l
Mn	800 – 2000 mg/l
pH	4 – 8

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
	Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
	Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

Alitii

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

С високо съдържание на калий и затова го прилагаме основно в зеленчукови и етерично-маслени култури. Калият е елемент, който влияе пряко върху водния баланс и обмяната на вещества в растенията. Дава много добри резултати при зеленчуци и има силно влияе върху маслеността при слънчоглед и рапица (доказано повишава с 3 пункта маслеността на слънчогледа – нещо, което сме забелязали и по нашите полета).

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "Alitii". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "Alitii".



ДОБИВ ОТ ДКА	ПШЕНИЦА	ЦАРЕВИЦА	СЛЪНЧОГЛЕД
БЕЗ ТРЕТИРАНЕ	643	912	362
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE	662 (РАЗЛИКА 51КГ)	945 (РАЗЛИКА 48КГ)	400 (РАЗЛИКА 68,75КГ)
СЕМЕНА ТРЕТИРАНИ С EXTRA FORCE + ДВУКРАТНО ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ С ALITII (2021Г.)	694	950	431,25

РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	8,0 – 16,0 %
Органичен въглерод*	1,0– 6,0 %
N*	0,05 – 0,5 %
P_2O_5	0,015 – 0,06 %
K_2O	2,0 – 6,0 %
MgO	2000 – 6000 mg/l
CaO	200 – 1500 mg/l
S	3000 – 8000 mg/l
Zn	1000 - 5000 mg/l
Cu	150 - 500 mg/l
Mo	50 - 500 mg/l
B	1000 – 10000 mg/l
Fe	1000 – 4000 mg/l
Mn	150 – 7500 mg/l
pH	9 – 14

*На база сухо вещество

*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

gurii

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Увеличава биомасата на растението (увеличава площта на листните петури), получава се по-добра фотосинтеза, а оттам идват и по-високите от към качество и количество добиви. Можем да го приложим рано напролет след встъпване на пшениците и ечемиците във вегетация, за да ги стимулираме бързо към правилен растеж и развитие. Много добри резултати получаваме при двукратно приложение (първо след встъпване на културите във вегетация и второ преди изкласяване, заедно с фунгицидното третиране. Приложим при царевица след трети лист на културата, в слънчоглед след първа-втора същинска двойка листа. Можем да го прилагаме по всяко време, когато растението изпитва най-голяма нужда.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате "gurii". Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество "gurii".



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

- ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ
- РАПИЦА
- СЛЪНЧОГЛЕД
- ЦАРЕВИЦА
- ОВОЩНИ
- ЗЕЛЕНЧУКОВИ
- БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	15,0 – 30,0 %
Органичен въглерод*	0,2 – 5,0 %
N*	3,0 – 8,0 %
P_2O_5	1,0 – 5,0 %
K_2O	4,0 – 9,0 %
MgO	2000 – 5000 mg/l
CaO	20 – 200 mg/l
S	3000 – 10000 mg/l
Zn	1000 - 5000 mg/l
Cu	10 - 500 mg/l
Mo	50 - 500 mg/l
B	2000 – 10000 mg/l
Fe	500 – 4000 mg/l
Mn	100 – 800 mg/l
pH	4 – 8

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход на продукта, стойностите могат да варират

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло "цветоносно"	100-200 мл/дка
		Фаза от "Розетка" до "Бутонизация"	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

Azarii

СОБСТВЕН ПАТЕНТ

ОДОБРЕН ЕКО СХЕМА 3

Органо-минералният биостимулатор “Azarii” е с най-високо съдържание на желязо. Поради този факт можем да го приложим най-успешно при овощните култури и лозята. Разбира се желязото е необходим елемент при всички останали култури. В зависимост от нуждите на растението го прилагаме и в пшеница, ечемик и зеленчукови култури. При остра нужда от желязо го прилагаме в дозата от 200 мл на декар.

Намалете стресът от прекия контакт на химичните вещества от пестицидите с растенията като използвате “Azarii”. Първо се приготвя разтвора с пестицида и непосредствено преди пръскането в него се добавя необходимото количество “Azarii”.



РЕГИСТРИРАН ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ

РАПИЦА

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

ОВОЩНИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

Сухо вещество	3,0 – 7,0 %
Органичен въглерод*	3 – 8 %
N*	0,6 – 2,0 %
P_2O_5	0,01 – 0,1 %
K_2O	1,5 – 3,5 %
MgO	50 – 1500 mg/l
CaO	50 – 500 mg/l
S	2000 – 6000 mg/l
Zn	10 - 1000 mg/l
Cu	10 - 750 mg/l
Mo	100 - 1000 mg/l
B	200 – 1000 mg/l
Fe	5 – 1000 mg/l
Mn	10 – 1000 mg/l
pH	7 – 13

*На база сухо вещество
*Поради естественият и органичен произход

	КУЛТУРА	ТРЕТИРАНЕ	ДОЗА
	Пшеница, ечемик, овес	Фази край на братене, вретенене и начало на изкласяване	100-200 мл/дка
	Царевица	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Слънчоглед	Фаза 5-8 лист(съвместнос хербициди)	100-200 мл/дка
	Рапица	Фаза 2-6 лист (есенно пръскане)	100-200 мл/дка
		Фаза Формиране на стъбло “цветоносно”	100-200 мл/дка
		Фаза от “Розетка” до “Бутонизация”	100-200 мл/дка
	Овошни култури (ябълки, праскови, кайсии, сливи)	Два-три пъти след цъфтеж през 30 дневен интервал	100-200 мл/дка
	Лозя (винени, десертни)	Двукратно при дължина на летораста 10см и образуване на ягорида - грахово зърно	100-200 мл/дка
	Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан..)	Третира се през цялата вегетация през интервал 7-14 дни	100-150 мл/дка
	Бобови култури (грах, фасул)	Две вегетационни третирания след цъфтеж през 15-20 дни	100-150 мл/дка
	Лук, чесън, праз, моркови, зеле, картофи, листни зеленчуци	Двукратно след разсаждане през 10-15 дни	100-150 мл/дка
	Тикви	Трикратно третиране през вегетацията, фаза 3-5 лист, преди цъфтеж, преди формиране на плодовете	100-150 мл/дка
	Дини и пъпеши	Двукратно през вегетацията, прицъфтеж и наедряване на плодовете	100-150 мл/дка
	Ягоди, малини, къпини, касис	По време на цялата вегетация през 10-20 дни	100-150 мл/дка
	Люцерна, пасища, тревни площи	След излизане от покой и 10-15 дни след всеки откос (при формиране на биомаса)	100-200 мл/дка
	Цвекло	Трикратно внасяне във фази 4-6, 6-8 и 8-10 лист	100-200 мл/дка
	Тютюн	След разсаждане две третирания през интервал от 20 дни	100-200 мл/дка
	ВСИЧКИ КУЛТУРИ	СЕМЕНА	100-200МЛ / 100КГ СЕМЕНА

ОПИТИ ПШЕНИЦА



ОПИТИ ПШЕНИЦА



ОПИТИ ПШЕНИЦА





ОПИТИ ПШЕНИЦА





ОПИТИ ПШЕНИЦА





СЛЪНЧОГЛЕД







РАПИЦА





ЕЧЕМИК





СЛЪНЧОГЛЕД





ЦАРЕВИЦА



КОНТРОЛА



ТРЕТИРАНА СЪС ZINOVII CORN



ТРЕТИРАНА СЪС ZINOVII OIL

ПШЕНИЦА



КОНТРОЛА



ТРЕТИРАНА СЪС ZINOVII TRIPLE



ТРЕТИРАНА СЪС ZINOVII GRAND

ВАШИТЕ ОПИТИ



СПОДЕЛЕТЕ С НАС И ВАШИТЕ ОПИТИ. СИГУРНИ СМЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ОБМЕНИМ МНОГО И ДА СМЕ СИ ВЗАИМНО ПОЛЕЗНИ!

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА

Доверието и използването на продуктите от гамата **EXTRA FORCE** води не само до гарантирано увеличение на добивите, но и ще ви заведе **до най-красивите и мечтани точки по света**. Обещано!

*** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ**

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОДУКТИТЕ НИ



ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА



Борис Колев
0887 548 131



Владимир Димов
0888 818 281



Кристиан Илинколов
0888 220 443



Мартин Петров
0885 397 318



Димитър Димитров
0887 082 679



Теодора Атанасова
0885 397 307



Юлия Попова
0884 485 602



Виолина Недкова
0885 397 338



Иван Иванов
0885 697 743



Ели Петрова
0882 464 441



Ивелин Йовков
0888 388 374



Александър Съботинов
0882 285 700



Виктор Спасов
0882 465 533



Теодор Тачев
0884 446 344



Тихомир Иванов
0898 805 800



Йорданка Димитрова
0887 316 726



Георги Георгиев
0888 392 254



Пламен Иванов
0883 464 829



Момчил Михалев
0894 640 516



Янко Стефанов
0897 962 081



Радослав Димов
0882 335 971



Добромир Марков
0885 397 313



Пламен Петров
0882 266 070



Галина Кръстева
0882 568 174



Ивайло Викентиев
0897 503 162



Нено Лулов
0886 509 317



Камен Димов
0889 505 900



Милен Стефанов
0885 959 496



Ана Тодорова
0882 790 630



Моника Мицова
0888 391 458



Венелин Василев
0887 695 071



Диана Тодорова
0889 897 855

